


Cette fiche d'information vous a été remise pour vous aider à répondre à certaines de vos questions sur le détachement du vitré postérieur.

### Détachement postérieur du vitré : c'est quoi ?

Le vitré est le gel translucide qui remplit la partie postérieure de l'œil. Lorsque la membrane contenant le vitré se détache de la rétine : c'est un décollement postérieur du vitré.



### Symptômes du décollement postérieur du vitré

**Corps flottants** : Suite au décollement, le vitré et sa membrane « flotte » librement dans l'œil et peuvent apparaître comme des taches mobiles avec les mouvements oculaires. Ces corps flottants peuvent prendre la forme de mouche, des filaments ou de toile d'araignée.

**Flashes** : brefs (moins de une seconde), localisés le plus souvent dans la partie temporale de la vision et mieux visibles la nuit. Ces flashes traduisent une traction exercée par le vitré sur la rétine.

### Que faire en cas de symptômes de décollement postérieur du vitré ?

Les symptômes de décollement postérieur du vitré (corps flottants et flashes) doivent conduire à une consultation ophtalmologique rapide (dans la semaine). En effet, il faut réaliser un fond d'œil pour confirmer la présence du décollement du vitré et éliminer les complications (hémorragie, déchirure rétinienne et décollement de rétine).

### Comment traiter un décollement postérieur du vitré ?

Classiquement le décollement postérieur du vitré ne nécessite pas de traitement, l'évolution est spontanément favorable avec une diminution ou disparition des corps flottants. A noter que cela prend en général plusieurs semaines et qu'il n'est pas rare qu'il persiste un corps flottant plus discret. Dans les cas extrêmes (ce qui reste exceptionnel) on peut proposer un traitement de ces corps flottants (laser ou chirurgie) s'ils persistent dans le temps et entraînent une gêne importante.

### Qu'elle conduite à tenir après la consultation ophtalmologique ?

Après la consultation ophtalmologique qui a confirmé le diagnostic de décollement postérieur du vitré (et éliminé les complications possibles), une éventuelle augmentation des symptômes devra conduire à renouveler l'examen du fond d'œil. En effet, le décollement postérieur du vitré est un phénomène progressif, des déchirures rétiniennes peuvent donc apparaître dans un second temps.